Профессиональное руководство по продуктам для биохакинга

Эта брошюра разработана, чтобы предоставить вам всю необходимую информацию для безопасного обращения, подготовки и использования ваших продуктов для биохакинга.

КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

Retatrutide & Tirzepatide

Передовые продукты для биохакинга для метаболической оптимизации и эффективного контроля веса.

NAD+

Жизненно важный кофермент для клеточной выработки энергии, ясности ума и антивозрастного эффекта.

MOTS-c

Митохондриальный продукт для биохакинга, который регулирует метаболическую функцию и повышает физическую работоспособность.

SS-31

Оптимизирует здоровье митохондрий и защищает от клеточного стресса.

GHK-Cu

Исключительное средство для регенерации кожи, заживления ран и выработки коллагена.

CJC-1295 / Ipamorelin

Синергетическая комбинация для стимуляции собственного восстановления организма и обеспечения более глубокого сна.

Thymosin Alpha-1

Укрепляет и модулирует иммунную систему.

РУКОВОДСТВО: СМЕШИВАНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

Восстановление (Смешивание)

Продукты для биохакинга часто поставляются в лиофилизированной (сублимированной) форме и перед использованием должны быть восстановлены бактериостатической водой.

1. Вводите бактериостатическую воду очень медленно по внутренней стенке флакона.
2. **Не трясите флакон!** Вместо этого осторожно покатайте его между ладонями, пока порошок полностью не растворится.

> **Важно о гигиене**
>
> Всегда тщательно мойте руки. Перед каждым использованием дезинфицируйте резиновую пробку флакона и место применения спиртовой салфеткой (например, Alco-prep).

ИНСТРУКЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

> **Невскрытая упаковка (порошок)**
>
> Хранить в темном и прохладном месте, желательно в холодильнике (2–8°C). Холод значительно продлевает срок годности продуктов.

> **Смешанный (восстановленный) продукт**
>
> Должен **всегда** храниться в холодильнике (2–8°C). Беречь от прямых солнечных лучей и замораживания. Смешанный продукт для биохакинга обычно сохраняет свою полную эффективность до 30 дней при правильном хранении.

РУКОВОДСТВО ПО ДОЗИРОВКЕ (ШПРИЦ 1 МЛ)

При использовании стандартных инструментов объемом 1 мл (U-100) для измерения применяются следующие ориентиры:

- **Весь объем** = 100 делений (единиц/units) = 1 мл.
- **10 делений** (единиц) = 0,1 мл.